

**Dansk Pædiatrisk Hæmatologi Onkologi – DAPHO -
– Pædiatrisk hæmatologi-onkologi**

Nedenforstående regler kan afviges ved lægeordination

*eller nylig indgivet thrombocytkoncentrat

	DAPHO- Danske grænser
SAGM	
Hb ≤ ...	5,0 mmol/l eller ved symptomer
Under strålebehandling: Hb ≤	5,0 mmol/l
Mængde	15 ml/kg, maks 1 portion
Infusionstid	5,0 ml/kg/time eller 3 timer/transfusion
Trombocytkoncentrat	
Trombocytaltal ≤	10 mia/l
Ved tp ≥ 38,5	10 mia/l
Ved langvarig blødning	Uanset tal
Før lumbalpunktur	Diagnostisk LBP:50 mia/l * derefter 20 mia/l *
Før knoglemarvspunktur	Intet krav
Anlæggelse af CVK	50 mia/l *
Fjernelse af CVK	50 mia/l *
Anlæggelse af PEG	50 mia/l *
Biopsi/kirurgi/BAL	50 mia/l *
Leverbiopsi	50 mia/l *
Anlæggelse af nasalsonde	20 mia/l *
Høj klyks	30 mia/l *
Anlæggelse af KAD	20 mia/l for piger * 50 mia/l for drenge *
PEP/CPAP	20 mia/l *
Intramuskulære injektioner	> 30 mia/l *
Subkutane injektioner	Intet krav med mindre der er større hæmatomer
Mængde	7 ml/kg, maks 1 pool
Infusionstid	15 ml/kg/time eller 1 time/ transfusion

Buchanan GR. Blood transfusions in children with cancer and hematologic disorders: Why, when, and how ? *Pediatr Blood cancer.* 2005;44:114-16

Guidelines for the use of platelet transfusions. *British Journal of Haematology.*2003;122:10-23

Spinella PC et al. Survey of transfusion policies at US and Canadian children's hospitals in 2008 and 2009.*Transfusion.* 2010:1-8